



Tandproblem är bland de mest smärtsamma tillstånd att hantera. Men det hot de utgör underskattas kontinuerligt och folk bara beklaga ignorera dem när tillståndet har blivit betydligt värre och, därför, svårare för att bota. När påverkas av en böld, bildar puss i tandköttet och inte i benet. En dental abscess är en infektion i den mun, ansikte, käken eller halsen som börjar som en tandinfektion eller hålighet. Dessa infektioner är vanliga hos personer med dålig tandhälsa och resultatet av brist på lämplig och läglig tandvård. Bakterier från en hålighet kan utöka i tandköttet, kinden, halsen, under tungan, eller ens i käken eller ansiktsbehandling ben. En tand abscess kan bli mycket smärtsamt när vävnaderna blir inflammerade. När inflammationen sprider sig in i den bärande konstruktionen av tänderna, kommer att det resultera i dental abscess. Detta kommer därefter att förstöra den bärande konstruktionen av tänder, ben och vävnad. Förstörelsen

leder sedan till bildandet av fickor. Matrester kommer att samlas i fickor att bilda plack och tandsten. Detta skapar ett gynnsamt miljö för bakterierna att leva och föröka. I slutändan infektion sätter in och pus framkallar i tandköttet. En dental abscess eller tuggummi abscess kan orsaka tandvärk och andra symtom. Bölder kan bilda mycket snabbt. Ibland bildar de bara en eller två dagar efter infektion börjar. Om du misstänker att du har en dental abscess eller tuggummi abscess, se en tandläkare så snart som möjligt för behandling. Utan behandling, villkoret är sannolikt att bli värre, och du kan förlora drabbade tanden. Komplikationer är ovanliga, men kan vara allvarliga och till och med livshotande.

Tuggummi abscess eller parodontala abscess

En tuggummi abscess som också kallas en parodontala abscess oftast orsakas av en infektion i utrymmet mellan tanden och tandköttet. Infektion kan uppstå efter mat fastnar mellan tanden och tandköttet. Hos personer med svår tandlossning, kan bakterier bygga upp under tandköttet och i benet. Tuggummi abscess kan bilda runt en levande tand. Början från tandköttet, fungerar pus sig själv i benet genom att skapa ett hål i benet runt tänderna. Detta kommer

så småningom att förstöra underliggande ben. Problemet kan bara förvärras. Det är därför tandlossning kan inte lämnas obehandlade. Parodontala bölden orsakar ofta tandköttet att lossna något från tanden. Detta orsakar fickor till form som kan bli fylld med bakterier och framsteg att bilda en abscess. En parodontala abscess kan också utvecklas som en komplikation av skada att den tandkött eller periodontium. En parodontala abscess kallas ibland en tuggummi koka som bölden orsakar en svullnad att utveckla bredvid en tand. Om du trycker tandköttet runt tänderna, det gör ont. Du kan ha svårigheter att öppna munnen på grund av svullnad och inflammation i tandköttet nära tänderna. Tänk på att infektionen kan spridas till andra områden som tuggummi om du inte får rätt behandling. Om du behöver akut tandvård, är du redan i den akuta fasen av tandköttsproblemet. God tandhygien och regelbundna tandvård besök kan stoppa tuggummi abscess från att utvecklas. Om en fistel har bildats, kommer att din tandläkare spåra det tillbaka till källan till infektionen. Din tandläkare kommer att infoga en flexibel och tunn bit material i fistel. Detta kommer att visas på en röntgenbild och Visa tandläkaren där fistel leder. När din tandläkare rensar ut infektionen, stängs fistel

oftast på egen hand.

Tand abscess eller dental abscess

En tand abscess kallas också en dental abscess uppstår inuti tanden. Detta händer när tandens nerv är döda eller döende. Denna typ av abscess visar upp på toppen av tandens rot. Sedan det sprider sig till omgivande ben. Symtom av en dental abscess är vanligtvis smärta, svullnad och rodnad av mun och ansikte. Med en avancerad infektion, kan du drabbas av illamående, kräkningar, feber, frossa och diarré. Tecken på dental abscess vanligtvis inkluderar, men begränsas inte till, karies, tandköttsinflammation, oral svullnad, ömhet med touch, pus dränering och ibland svårigheter att fullt ut öppna munnen eller svälja. Se en tandläkare så snart som möjligt. Tandläkare kommer normalt att dränera pus och detta ofta ger bra lindring av symtom. Detta görs antingen genom lancing tand abscess eller genom att borra ett litet hål i tanden att låta pus flykten. Ibland, om infektionen inte finns, förskrivs ett antibiotikum för ett par dagar efter tömning pus för att rensa alla kvarvarande infektion. Dock i de flesta fall är ett antibiotikum förmodligen inte behövs när pus dräneras. Om infektionen inte behandlas, kan det skada den omgivande ben och tänder. En ihålig

tunnel ibland former genom ben och hud att pus rinna. Denna tunnel kallas en fistel eller sinus-tarmkanalen. Du kan se eller känna detta öppna inuti munnen. Det ser ut som en finne. Om du har pus dränering genom en fistel, kan du märka en konstig smak i munnen. Om en tand abscess är mycket stor eller om tanden är illa skadad, kan du behöva ha tanden tas bort. En stor tand abscess måste ofta tömmas. Tandläkaren gör ett hål i tandköttet genom benet som ger en avfart väg för någon vätska eller pus. Detta minskar risken för ytterligare spridning av infektionen.

Hem rättsmedel för tand Abscess eller dental abscess och hem rättsmedel för tuggummi abscess eller parodontala abscess

Mer tandvården du ger dina tänder och tandkött vid tidigare stadier, enklare och mer effektivt det skulle vara att behandla tillståndet. Dämpa smärtan är ett av de främsta bekymmer, och en av de bästa hem rättsmedel behandlingsalternativ för detta är att använda vissa mouthwashe som är lätt tillgängliga på marknaden idag. Anti-inflammatoriska, anti svamp och anti bakteriella egenskaper munvatten gör det en av de mest potenta lösningarna när det gäller villkoret. En av de bästa sätten att behandla en dental abscess är utsatt

för en viss mängd värme. Detta kan göras genom att placera en ren, varm ansikte trasa över koka upp under ca 20 minuter på hyresavtal tre gånger om dagen. Att hålla några uppvärmda dukar ansikte häändig kan du rotera dem och se till att värmen förblir konstant. Utföra denna behandling regelbundet för bästa resultat. Värmen tar inflammationen till ett huvud. Ett annat alternativ skulle vara att tillämpa en torr tepåse mellan tanden och tandköttet och lämna det där för en period på mellan 45 och 60 minuter. Försök att placera den på sidan icke svullna och höja huvudet lite för att tillåta te i blöt över tandköttet och tand för effektivare resultat. Din tandläkare kan ge dig ett recept för antibiotika och smärtstillande medel. Dessa läkemedel hjälper bölden läker och hålla infektionen sprids. Antibiotikabehandling är den bästa tillfällig lättnad för parodontal abscess. Den administreras under en tand akut. Du borde få lättnad mellan 24 till 48 timmar.