



Edentulism är ett tillstånd där en person har komplett tandlossning. Ibland, om en person har bara några tänder kvar, kallas det partiella edentulism. Totala tandlossning är ett förebyggbara tillstånd, men om det inträffar, patienter har några behandlingsalternativ som finns. Den totala förlusten av tänderna kan uppstå successivt under åren. En av de främsta orsakerna till tandlossning är parodontala sjukdomar eller sjukdomar i tandkötet. Detta inträffar vanligen på grund av dålig tandhygien. Patienter med denna sjukdom ofta inte borste och tandtråd tänderna regelbundet, inte heller söker de regelbundna tandvård checkups. En patient som upprätthåller konsekvent god munhygien är mycket mindre sannolikt att drabbas av partiell eller fullständig tandlossning. Den kan också återspegla attityder av patienten eller leverantör, tillgänglighet till tandvård eller rådande samhälleliga attityder till hälsa munhygien. Edentulism är betydligt mindre utbredd

i högre än lägre socioekonomiska segment av befolkningen. Kvinnor har konsekvent visas högre priser för edentulism och bli tandlös i tidigare åldrar än män. Denna skillnad, kan medan det är svårt att förklara, vara representativa för skillnader i förhållandet tandläkare patienten, i stället för skillnader i sjukdomsmönster. Dentally oförsäkrade har konsekvent visat högre nivåer av edentulism, som kan vara ett resultat av begränsad användning av förebyggande och reparativ tandvård. Riskfaktorer för edentulism inkluderar socioekonomisk status, inkomst, utbildningsnivå och rökning. Tandlös individer har identifierats som löper större risk för hjärt-kärlsjukdom än dentate individer. Lagring av färre tänder hos äldre vuxna har varit korrelerad med sämre hälsa, i motsats till större tand lagring bland människor i samma ålder som rapporterar bättre allmänhälsa.

Edentulism hindrar människor från att känna sig säker om sitt utseende. Många vuxna tvekar att ge sig in i allmänheten utan tänder. På grund av deras saknade tänder, de känner sig generad att Le och saknar förtroende för att träffa folk eller prata med dem. Edentulism påverkar tal, mycket ljud och ord som vi yttrar, beror på våra framtänder. Tandproteser också

påverkar tal, särskilt om proteser är illasittande. Individen tenses oftast ansiktsmusklerna att hålla proteser på plats, eller ständigt använder tungan för att ordna det; vilket resulterar i sluddrigt tal och klickande ljud. Tandlös individer löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Tandlös individer har att hantera förändrade utseende, som tandlossning ändrar sina insjunkna kinder, stöds inte läppar, kollapsade jawline, vilket gör hakan och näsa visas närmare ansiktsform. Det finns en stor förändring i en persons utseende eftersom tänderna, som stöder ansiktsmusklerna inte längre finns. Totala tandlossning accelererar ansiktets åldrande, benet minskar i höjd och tjocklek, käkbenet börjar krympa gör ansiktet ser äldre ut.

En annan orsak till tandlossning är fysiskt trauma. En person kan förlora en eller flera tänder i en bilolycka eller annan olycka. Tandlossning kan också uppstå på grund av ett annat tillstånd, till exempel käkleden ledproblem eller TMJ, som kännetecknas av käken smärta. Denna störning kan leda till tandlossning på grund av fysisk stress på tänder och omgivande benstrukturen. Det finns några faktorer som kan predisponera en person att utveckla edentulism. Förutom dålig tandvård, kan patienter vara större risk för detta tillstånd om

de röker, om de är äldre än 35, och om de är män. Diabetes, ledgångsreumatism och högt blodtryck kan också predisponera en person för edentulism. Patienter med edentulism har några behandlingssalternativ att överväga. Full proteser är en möjlighet, men det finns flera nackdelar med detta alternativ. Dessa falska tänder kan inte bo i rum samt partiella proteser. Trycket från full proteser kan också påskynda absorptionen av den underliggande benstrukturen tillbaka in i kroppen. Detta kan försvåra tugga. Ett annat behandlingsalternativ är tandimplantat. Med denna behandlingsmetod infogas en metall implantatet i käkbenet, förbi tandköttskanten. Patienten måste sedan vänta ytterligare behandling så att tandkötet att läka runt implantatet. En gång läkt och ben kan hålla implantatet på plats, kan tandläkaren anbringa en krona att implantatet. Implantat kan ersätta några eller alla av de saknade tänderna. De tenderar att vara dyrt, så att vissa patienter kan välja för att ha ett par implantat placeras i strategiska intervall runt munnen. Tandläkaren kan då följa en fast bro för att ersätta resten av tänderna. En fast bro är en enhet som är en falsk tand förankrad antingen de omgivande naturliga tänderna eller dentala implantat. Patienter bör nog överväga sina behandlingsalternativ hos